


¡ Enhorabuena por la noticia: la perrita está gestante ! Para intentar ayudaros en este momento tan especial, pero a la vez estresante, os vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre la gestación y el parto de la especie canina. Si todo se desencadena con normalidad no habrá problemas, pero es muy interesante que sepáis qué cosas no son normales, para que así podáis consultarnos lo más rápidamente posible. La mayoría de la información será por todos conocida, pero consideramos que un repaso general puede ser muy útil. Empecemos:

- La gestación en la perra dura aproximadamente dos meses. La variabilidad es bastante amplia (58-72 días) puesto que es difícil saber el momento exacto en que se produce la fertilización. Además, también hay diferencias según cuál sea la raza de los padres, el número de parto , tamaño de la camada, etc.
- En las perritas, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres con la “subida de la leche”, las mamas pueden tener secreción incluso desde quince días antes del parto.
- Es muy importante que las desparasitaciones y vacunaciones estén al día en la perra gestante. Eso no sólo será bueno para ella, sino que garantizará una buena protección inmunitaria a los cachorros, que recibirán sus anticuerpos (defensas) a través del calostro (primeras tomas de leche).
- Es bueno que la perrita tenga reservas corporales para la lactación, puesto que es una fase que supone un gasto metabólico brutal para ella. Cuando la hembra lleve aproximadamente unos 40 días preñada, lo ideal es que sustituyamos su pienso normal por uno más equilibrado para este momento en relación a la energía, vitaminas y minerales, como es el pienso especial para hembras gestantes o el de cachorros en crecimiento. Si es posible, el cambio debe hacerse progresivamente mezclándolos en 4 o 5 días (primero con más del antiguo, y luego con más del nuevo). A partir de la mitad de la gestación tiene que comer pequeñas cantidades unas 4 o 5 veces al día, porque el estómago tiene cada vez menos sitio en el abdomen debido a la dilatación uterina. Por eso, lo mejor es poner la cantidad recomendada para todo el día a su disposición, y que se lo coma al ritmo que le apetezca. Como siempre, el animal tiene que tener agua limpia y fresca al lado del pienso. Cuando la perra lleve 3 semanas amamantando a los cachorros tomará un 100 % más de pienso que antes del cruzamiento.
- Si podemos pasear a la perra más a menudo, ella estará encantada y aliviada. En cualquier caso no debemos hacer que se canse (debe pasear, pero no correr). Sólo debe moverse lo que ella quiera.
- Cuando lleve 45-50 días gestante, es el momento de preparar una paridera. Lo mejor es que esté en una habitación sin corrientes, con un ambiente húmedo y caliente, donde la perra se sienta cómoda y confiada. El lugar que normalmente cumple estos requisitos es la zona de la casa donde ella tenga desde siempre su cuna o colchón. Si bien es cierto que en los supermercados podemos encontrar parideras comercializadas, nuestro consejo es que la perra tenga una caja de plástico, que es fácil de limpiar y aislante del frío del suelo, cubierta con papel de periódico (el plástico sólo es resbaladizo). La altura será la suficiente para que la madre entre y salga sin dañarse y también para que cuando los cachorros empiecen a moverse no puedan salirse. Si se la enseñamos a la perra antes del parto, seguro que ella misma ayudará a prepararla, colocando los papeles como prefiera. Si estamos ante una raza grande, también es buena idea

utilizar una piscina de plástico para niños. Es mejor no colocar telas o trapos porque además de ser poco higiénicas, los cachorritos pueden quedarse atrapados en los pliegues. Está muy aconsejado atravesar la paridera con dos o cuatro barras paralelas a los lados, colocadas a distinta distancia de las paredes según la raza de la camada, para prevenir que las hembras puedan pisar a los pequeños al ponerse nerviosas (“barras salvacachorros”)



- La perra y su entorno deben estar limpios, pero es mejor no bañar al animal directamente. Si está muy sucia, podemos usar limpiezas en seco (toallitas húmedas, espumas en seco, etc)
- A partir del día 25-28 de gestación podemos diagnosticar la gestación mediante la realización de una ecografía, que además nos permitirá comprobar la viabilidad de los cachorros al valorar el latido cardiaco de los mismos. Sin embargo, para saber exactamente el número de cachorros, lo indicado es realizar un par de radiografías entre los días 45-55 de gestación.
- Si no sabemos qué macho la ha cubierto, o si tiene una camada poco numerosa, puede ser que los cachorros sean muy grandes para su talla y le provoquen un parto difícil. Lo ideal es que 1 o 2 días antes de la fecha prevista para el parto le realicemos una radiografía ventro-dorsal para intentar predecir si la pelvis de la madre será lo suficientemente amplia para permitir el paso del diámetro bi-parietal de la cabeza del feto. También nos permitirá saber si el primer feto está bien colocado para que se desencadene el parto.
- Cuando el momento se esté acercando (y si no lo habéis visto nunca os aseguramos que es maravilloso) la persona que más confianza tenga con el animal es quien debe acompañarle. Sabréis que ha llegado el momento si la perra está intranquila, patalea, se mira el flanco (el espacio entre la barriga y la extremidad posterior), busca el nido, jadea, etc. Una buena forma de saberlo (si el animal se deja) es tomarle la temperatura dos o tres veces al día (metiendo el termómetro en el ano). La temperatura normal de un perro es superior a la de las personas (38-38.5 °C). Cuando queden 24 h para el parto la temperatura desciende 1 o 1,7 °C. Es normal que a veces vomiten y orinen a la vez que tienen contracciones.

- El parto empieza cuando comienzan las contracciones uterinas. Una contracción es manifestada en la perra como un esfuerzo muy grande para deponer. Lo normal es que una vez ocurre esto, el primer cachorro salga unos 20 minutos después. El tiempo límite que debe alarmaros es que pasen dos horas con contracciones sin producirse expulsión fetal.
- Cuando el momento es inminente lo primero que se ve en la vulva es una bolsita con contenido líquido verdoso que se rompe justo antes de salir el primer feto. Lo normal es que lo haga todo ella. Expulsará al cachorro y se girará para liberarle de las bolsas que lo cubren, lo secará y hará que respire. Puesto que la naturaleza es muy lista, normalmente no suele nacer otro hasta que el anterior está en perfecto estado, deteniéndose incluso las contracciones entre uno y otro, para que la madre descanse.
- Algunas hembras, sobretodo primerizas, se atorán cuando tienen delante el cachorro recién parido. Por lo tanto, a veces los propietarios tenéis que ayudar a los nuevos miembros de la casa para que no les pase nada malo. Tenemos por tanto que imitar lo que haría su madre: quitarles las secreciones nasales, masajearles un poquito el tórax, colocarlos en una fuente de calor y si no maman administrarles suero glucosado.
- Algunas veces parece que los cachorritos se quedan “enganchados” en el canal del parto, sin poder salir al exterior normalmente. Si fuera necesario (en ese caso es preferible que nos llaméis para confirmaros si debe hacerse) podéis ayudar tirando de forma firme y continua del cachorro (es decir, sin hacer tirones bruscos), aprovechando una nueva contracción.
- Os aconsejamos que calculéis el tiempo que tarda en nacer cada cachorro, el tiempo total y sobretodo el tiempo que pasa entre uno y otro. Una perrita puede pasarse pariendo 12 horas (ese es el límite) ¡Pero también puede agotarse y que la cosa se complique! Lo normal es que el primer cachorro tarde entre 10 y 30 minutos en nacer (máximo 2 horas) y que entre cachorro y cachorro pasen de 5 a 60 minutos (máximo 4 horas). Si supera estos tiempos, puede haberse complicado (por eso es bueno que sepáis cuántos tienen que nacer, porque así sabréis si la parada implica que el parto ha terminado o se ha detenido por razones patológicas).
- Cada feto tiene su placenta. Lo normal es que expulsen cada una tras su cachorro (5-15 minutos) o cada 2 o 3 cachorros. Todas deben haberse eliminado como mucho 6 horas después de que nazca el último cachorro. La perrita suele comérselas, pero casi siempre eso les produce diarreas, así que cuando todos los cachorros estén fuera es mejor que se las quitéis antes de que las ingiera.
- Una complicación frecuente es que las perras recién paridas se queden sin calcio o sin glucosa, en cuyo caso estará decaída, dejará de lado a los cachorros, tendrá temblores e incluso convulsiones. Esto es una urgencia clínica que requiere tratamiento inmediato, por lo que si sucede tendréis que traer a la perra rápidamente a la clínica.

Esperamos que todo salga bien, que la perra sea muy buena madre y que ponga a sus cachorritos a mamar enseguida (es lo normal). Si pasara cualquier cosa rara, podéis llamarnos (916868079) y estaremos encantadas de ayudaros.



La mayor parte de las veces, la información referente al parto no suele servir para mucho, puesto que las hembras suelen aprovechar las noches para no ser molestadas. De todas formas es bueno que sepáis todo lo que es normal que suceda, pues si los acontecimientos se salen de esa norma, sabréis que es el momento de ayudarla.

De todas formas, si es posible, lo ideal es que nos traigáis a la perrita y los cachorros al día siguiente del parto, para comprobar que todo ha transcurrido con normalidad.

¡Suerte y un saludo!